

PRESCRIPTION INDIVIDUELLE VISANT LE TRAITEMENT DE SCLÉROTHÉRAPIE

Identification client(e) :

Nom : _____

Prénom : _____

DDN : _____

Date : _____

Traitement des varices superficielles (esthétiques), avec ou sans symptômes, de calibres de 3mm et moins par injections sclérosantes afin de diminuer les lourdeurs, douleur et/ou œdème et d'améliorer l'aspect esthétique des membres inférieurs.

La personne ci-haut identifiée a été évaluée et ne présente aucune des contre-indications mentionnées :

Diabète non-contrôlé, allergie connue aux agents sclérosants, thrombophlébite superficielle ou profonde dans les 6 derniers mois, personne sous chimiothérapie ou radiothérapie, maladie artérielle des membres inférieurs, hyperthyroïdie non traitée, femme enceinte ou allaitante, insuffisance rénale ou cardiaque, infection aux membres inférieurs ou généralisée.

Toute personne présentant une des contre-indications au moment du traitement ou présentant un problème veineux profond lors de l'évaluation ne sera pas éligible à la sclérothérapie et sera référée vers le phlébologue.

Les traitements seront à intervalle de 14 jours ou plus, le nombre de traitements varient selon la sévérité du cas.

J'autorise l'utilisation des agents sclérosants suivant :

Sclérodex : Dextrose USP 2500 mg/10mL (250 mg/ml) et chlorure de sodium, USP 1000 mg/10 ml (100 mg/ml) maximum 10ml par traitement.

Tromboject : Tétradécyl sulfate de sodium (10 mg/ml- 0,3 %) maximum de 9ml par traitement.

Le choix de l'agent sclérosant varie selon la longueur et le calibre de la veine afin de maximiser les résultats (selon protocole de sclérothérapie).

Le port du bas de compression médicale est suggéré pour diminuer la symptomatologie de la maladie veineuse superficielle et pour diminuer les symptômes inflammatoires durant la guérison post sclérothérapie.

Bas de compression (3 paires/an) 20-30 mmHg 15-20 mmHg Hauteur genoux Hauteur cuisses Hauteur taille/bas culotte

La clinique est située à moins de 10 minutes de 2 centres hospitaliers offrant des soins d'urgence.

Prescription valide pour 24 mois sauf si un changement de l'état de santé correspond aux contre-indications de traitement.

Bien qu'extrêmement rare en cas de traitement des varices superficielles (moins de 0,5% de risque), tout cas présentant des signes de thrombophlébite sera référé au médecin traitant s'il est joignable ou aux services d'urgences.

Protocole d'urgence en cas de choc anaphylactique :

- Appeler les services d'urgences immédiatement
- Administrer le Bénédril 50mg p.o. STAT si la personne peut avaler
- Si la personne ne peut avaler ou si la personne se détériore malgré l'administration du Bénédril :
- Injecter l'ÉPINÉPHrine :
- Dose : 0,01 mg/kg de poids corporel d'une solution de 1:1000 (1 mg/ml); dose MAXIMALE de 0,5 mg

- VOIE : INTRAMUSCULAIRE dans la partie antérolatérale de la mi-cuisse (muscle vaste externe)
- Répéter toutes les 5 minutes si les symptômes persistent ad prise en charge des services d'urgences
- Inscrire l'heure de chaque dose

Signature du médecin : _____

N°. Permis : _____

Coordonnées : _____